



PEYOTE (Mescalina)

• **Vía de administración:**
Oral, fumada o inhalada

• **Tipo de sustancia:**
Alucinógeno

• **Estatus legal en México:**
Ilegalizada

Efectos psicológicos

- Aumento de la sensibilidad y la percepción (espacial-temporal)
- Euforia o alegría
 - Ansiedad
 - Desinhibición
 - Retraimiento
- Sinestesia (mezcla de sentidos)
- Estados de concentración, ensañación e introspección

Efectos biológicos

- Náuseas
- Mareo
- Dilatación de las pupilas
- Aumento de frecuencia cardíaca y de la temperatura corporal
- Desarrollo de alta tolerancia

🌟 Tabla de riesgos de mezcla de sustancias psicoactivas 🌟

La combinación de sustancias psicoactivas incrementa significativamente los riesgos para la salud.

Mariguana	Alcohol	LSD	Hongos	Cocaína	2C-B	DMT	Metanfetamina
●	●	●	●	●	●	●	●
Poppers	MDMA	Benzodiacepina	Anfetaminas	Ketamina	Viagra	Opioides	Tramadol
●	●	●	●	●	●	●	●



Precaución



Inseguro



Riesgo alto



Riesgo crítico

Si no consumes, no lo hagas. Si decides hacerlo, infórmate.

Reducción de riesgos y daños

Antes

- Infórmate sobre las dosis y la duración de los efectos
- Conoce tu historial de salud mental (evita el consumo si hay predisposición a psicosis, esquizofrenia u otros trastornos)
- Si es tu primera vez, empieza con dosis bajas
- Planifica tu consumo considerando tu estado emocional y un espacio seguro
- Rodéate de personas de confianza y evita el consumo en solitario

Durante

- Usa dosis pequeñas y espacia el consumo
- Evita repetir dosis durante la experiencia
- Permanece en un entorno seguro y con acompañamiento
- Evita actividades de riesgo o que requieran coordinación
- Reconoce señales de malestar y comunícalas a personas de confianza
- Recuerda que los efectos son temporales
- No combines con otras sustancias

Después

- Descansa lo suficiente para permitir la recuperación física y emocional
- Hidrátate y aliméntate adecuadamente
- Evita actividades demandantes inmediatamente
- Busca apoyo profesional si persisten malestares físicos o emocionales

Señales de intoxicación aguda

Físicas

- Náuseas y vómito intenso
- Dolor abdominal
- Dolor de cabeza y sudoración
- Presión arterial alta
- Reflejos exagerados
- Falta de coordinación motriz
- Dilatación de las pupilas
- Exceso de saliva
- Sensación de hormigueo o entumecimiento

Cognitivas y conductuales

- Alteraciones perceptivas intensas y prolongadas
- Confusión o desorientación
- Ansiedad o ataques de pánico
- Dificultad para comunicarse
- Cambios importantes en la conducta

Señales de emergencia vital

- Vómitos persistentes con deshidratación
- Desorientación severa prolongada
- Convulsiones
- Aumento anormal de la temperatura corporal
- Taquicardia
- Rigidez muscular intensa
- Agitación (colapso físico o conductas de riesgo)
- Pérdida de la conciencia

¿Qué hacer en caso de intoxicación aguda?

Mantén a la persona en un espacio seguro, tranquilo y ventilado.

Ofrece apoyo emocional y habla con calma: recuérdale que la experiencia es temporal.

Si los síntomas de malestar son intensos o persistentes, contacta al personal médico más cercano.

Acompáñala hasta que reciba atención médica.

Evita que consuma otras sustancias psicoactivas.

Informa al personal médico de la sustancia consumida.

En caso de emergencia, comunícate al 911 o llévala al hospital general o toxicológico más cercano.

Si necesitas ayuda, acércate al IAPA.
Todas las personas tienen derecho a una atención digna, accesible y libre de discriminación.

Para recibir orientación, contención emocional o información sobre servicios, comunícate a la:



Línea LATIDO

55-5484-0436

Línea de emergencia 911

iapa.cdmx.gob.mx

IAPA CDMX Oficial

@iapacdmx

@iapa_cdmx

@iapa.cdmx

#CuidarnosEsParteDelJuego